

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

EDITION BAS-VIVARAIS

ABONNEMENT ANNUEL: 100 f

REGISSEUR RECETTES D.R.A.F.




RÉGION RHÔNE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CÉDEX 03

06 Janvier 1986

N° de série continue 111

Bulletin n° 1



TOUTE L'EQUIPE "PROTECTION DES VÉGÉTAUX"
DE RHONE-ALPES VOUS PRESENTE SES MEILLEURS
VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNEE.

P. 1-2 : ARBRES FRUITIERS et PETITS FRUITS : quelques remarques au sujet de
la dernière saison

P. 2 : VIGNE : taille et maladies

ARBRES FRUITIERS ET PETITS FRUITS

=====

QUELQUES REMARQUES AU SUJET DE LA DERNIERE SAISON

REMARQUES GENERALES /

MONILIA, MALADIES DE CONSERVATION : floraison saine mais toujours quelques problèmes à la récolte

La protection de la récolte doit être particulièrement soignée. Mais cela ne suffit pas. Les produits, même les plus performants "décrochent" si l'inoculum de Monilia est trop abondant : Limitez-le

- en faisant tomber tous les fruits invendables lors de la dernière cueille (pêcher, prunier). Vous éviterez ainsi leur momification et l'initiation très rapide du chancre à Monilia sur le rameau porteur.
- en supprimant les chancres à Monilia lors de la taille d'hiver.

PUCERONS : noir cendré, mauve ou vert : ayez l'oeil dès la chute des pétales

Certains pucerons peuvent déjà être traités avant la floraison (cendré du pommier, myzus).

Quoiqu'il en soit, vous êtes encore nombreux à laisser se développer des colonies de pucerons dangereux après la floraison (cendré du pommier, mauve du poirier, vert du prunier).

De plus le traitement, s'il est nécessaire, est d'autant plus efficace qu'il vise des jeunes colonies (Myzus par exemple).

ACARIENS ROUGES : pas de gros problèmes en saison, mais des pontes d'hiver abondantes dans de nombreux vergers.

L'intérêt du traitement d'hiver sur les acariens est limité : ne l'envisager, pour ce problème particulier, que si les pontes dépassent très largement les empâtements des rameaux pour s'installer à même les charpentières. Il faudra de toute façon envisager une intervention spécifique avant le début des éclosions ou à leur maximum. (les produits utilisables ne sont pas les mêmes).

CERISIER

MOUCHE : un seul traitement ne suffit pas sur les variétés tardives

Les variétés type Hedelphingen ou Napoléon nécessitent au moins 2 interventions.

PECHER

THRIPS : quelques dégâts sur certaines variétés de pêches

Les nectarines ne sont pas seules sensibles au Thrips. Pour les variétés où vous avez observé des dégâts (déformation avec plages liégeuses), prévoir une intervention au printemps prochain.

DEPERISSEMENT BACTERIEN : toujours pas de foyer dans le Bas-Vivarais, mais restez vigilants : DESINFECTEZ VOS OUTILS DE TAILLE ENTRE CHAQUE ARBRE A L'ALCOOL A BRULER.

POIRIER

PSYLLES : préservez les auxiliaires avant tout

Une fois de plus cette année montre la nécessité absolue d'éviter l'usage de produit polyvalent type GUSATHION, ULTRACIDE, DECIS, SUMICIDIN, etc... en période d'activité des auxiliaires (punaises prédatrices).

Soulignons l'intérêt de l'anti-carpocapse diflubenzuron (DIMILIN) dans le cadre d'une lutte raisonnée contre le psylle.

Traitement d'hiver : des précisions dans un prochain bulletin.

CECIDOMYE DES POIRETTES : un ravageur en progression sur LUSSAS

Des précisions au cours du printemps.

POIRIER - POMMIER

TAVELURE : une semence parfois abondante en verger de pommiers

Rappelons à ce propos que la durée d'action préventive des produits curatifs type BAYCOR, RUBIGAN, SAPROL n'est que de 3 ou 4 jours, c'est-à-dire qu'à partir de 4 jours après votre traitement avec un de ces produits votre verger n'est plus protégé.

TORDEUSE DE LA PELURE (CAPUA) : un ravageur en progression dans la Vallée du Rhône (ST JUST, ST MARCEL). Des précisions au cours du printemps.

PETITS FRUITS

MELON ET CASSIS : attention à l'oïdium

CASSIS : profitez de l'hiver pour éliminer les gros bourgeons

Des attaques de phytoptes sont à l'origine de déformation de bourgeons (gros bourgeons ronds qui avortent peu après le débourrement).

Surveillez vos jeunes plantations et ne les laissez pas envahir : coupez systématiquement les rameaux porteurs de gros bourgeons et brûlez-les.

Une plantation que l'on a laissé envahir nécessite un lourd programme de traitements.

VIGNE

TAILLE ET MALADIES DE LA VIGNE

Le tableau ci-après résume les précautions à prendre en présence de l'une des maladies citées.

Précautions concernant Maladies	Epoque de taille	Importance des plaies	Traitement d'hiver	Protection des plaies	Elimination des bois de taille
BLACK-ROT					Eliminer et brûler sarments porteurs de grappes malades
EXCORIOSE	Taille pas trop tardive si traitement arsenite prévu		facultatif		
ESCA		évitiez les grosses plaies sur le vieux bois	seule possibilité de lutte chimique	protection mécanique des grosses plaies	éliminez et brûlez le vieux bois de plus de 2 ans malade et les bras ou ceps morts
EUTYPIOSE	période sèche et non ventée			protection chimique des grosses plaies BENLATE 25 g/l	